



VÚVeL Academy - od výzkumu k praxi v chovech  
hospodářských zvířat, cyklus seminářů

**SBORNÍK ZE SEMINÁŘE  
5. 11. 2025  
(VÚVeL)**

**Budoucnost včel v industriální  
krajině**

Seminář přináší poznatky vzniklé v souvislosti s řešením výzkumného projektu QL24010241.



Česká technologická  
platforma pro zemědělství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci  
s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i.

si Vás dovoluji pozvat na seminář VÚVeL ACADEMY

# BUDOUCNOST VČEL V INDUSTRIÁLNÍ KRAJINĚ

Akce se uskuteční

**5. 11. 2025 9:30–14:30**

**Místo konání:** Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Hudcova 296/70, Brno 621 00

**Program:**

- Mikrobiota – přirozený štít zdraví včel – doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D. (ČZU)
- Ošetřování včelstev kyselinou šťavelovou – Mgr. Eliška Beranová (UPOL)
- Vitamín C a včely: pomocník nebo riziko? – Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (MUNI)
- Jakou virovou kontaminaci nalézáme v medu – RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (VÚVeL)
- Aktuální zkušenosti s metodou přemetení při tlumení bakteriálních chorob včel – MVDr. Martin Kamler (VÚ Včelařský)
- Poznatky o možnostech dezinfekce pomocí laserových paprsků – Mgr. Veronika Jeřábková, Ing. Dalibor Titěra, CSc. (VÚ Včelařský)
- Jak se hmyz brání včelímu jedu – *Drosophila model* – Mgr. Nela Prokúpková (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)

**Registrace:** on-line na odkazu [www.vri.cz/prihlaseni](http://www.vri.cz/prihlaseni)

**Kontaktní osoba:** doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.; e-mail: [sona.slosarkova@vri.cz](mailto:sona.slosarkova@vri.cz); tel.: +420 773 756 631

**Informace pro účastníky:**

- Účast na semináři je bezplatná, občerstvení je zajištěno.
- Seminář přináší poznatky vzniklé v souvislosti s řešením výzkumného projektu QL24010241.

## Mikrobiota - přirozený štít zdraví včel

doc. Jaroslav Havlík, Ph.D., ČZU

doc. Jiří Killer, Ph.D., ČZU

havlik@af.czu.cz



## Průvodce přednáškou

- Co je včelí mikrobiota, které organismy ji tvoří?
- K čemu je včele důležitá?
- Probiotika na trhu
- **Naše výsledky - Včelí štít**




Trávící trakt včel je charakterizován 9 hlavními třídami mikroorganismů, tzv. **JÁDROVÁ MIKROBIOTA**

### Gram-negativní:


1. *Snodgrassella alvi*
2. *Gillamella apicola*

### Gram-negativní:

1. Laktobacily Firm-4
2. Laktobacily Firm-5
3. Bifidobakterie
4. *Frischella perrara*
5. *Bartonella apis*
6. *Parasaccharibacter apium*
7. *Gluconobacter*




Trávící trakt včel je charakterizován 9 hlavními třídami mikroorganismů, tzv. **JÁDROVÁ MIKROBIOTA**






Mikrobiota tvoří v aktivní část povrchu střeva – včelí štít



Motta and Moran, *Nature Reviews Microbiology* 22, 122 (2024)

Zajišťuje robustní výživu i u nevyvážené potravy





- Všechny bakterie jádrové mikrobioty jsou důležité, dohromady syntetizují:
  - vitaminy skupiny B
  - nukleové báze
  - aminokyseliny

## Úloha jádrové mikrobioty

- Nahrazuje enzymy, které včela nemá
- Syntetizuje vitaminy a aminokyseliny
- Pomáhá rozkládat polysacharidy a bílkoviny z pylu
- Inaktivuje pesticidy
- Harmonizuje pH prostředí střeva
- Vytváří antimikrobiální látky a stimuluje produkci imunitních látek ve střevní sliznici
- Není z velké části planktonická, ale tvoří biofilm střeva

➤ Vyšší hmotnost dělnice


<https://biokimicroki.com/fundamentals-of-biofilm/>



jádrová + mikrobiota =



- Pyl středoevropských rostlin má relativně **malý obsah důležitého methioninu** (=limitující aminokyselina)




[10.26786/1920-7603\(2014\)14](https://doi.org/10.26786/1920-7603(2014)14)



## Deaktivuje pesticidy


- Bezmikrobní včely mají vyšší úmrtnost na pesticidy a antibiotika než včely s konvenční mikrobiotou
- Bezmikrobní včely mají vyšší rezidua pesticidů v těle
- Přímá detoxifikace a zvýšení aktivity CYP450, detoxifikačních enzymů v trávicím traktu



<https://doi.org/10.1111/1751-7915.13579>


## Zvýšení hmotnosti dělnic a vliv na sytost

- Bezmikrobní dělnice jsou daleko menší, hladovější (*proboscis* experiment) a rostou pomaleji
- Mikrobiota aktivuje inzulinové signální dráhy a navozuje pocit sytosti



<https://doi.org/10.1073/pnas.1701819114>

## Dynamika v průběhu vývoje jedince




• <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118707>

- Zastoupení mikrobioty roste až do období předkukly
- Po vylíhnutí plodu je mikrobiota nejprve náhodná, postupně se stabilizuje
- Získává se prostřednictvím trofalaxe, stykem s výkaly z prostředí plástů

## Rozdíly mezi jedinci


- Larvy těsně před zavíčkovaním (5. instar) a černé kukly se liší ve složení mikrobioty, ale mezi jedinci jsou obrovské rozdíly



<https://doi.org/10.1186/s12866-019-1490-y>

## Dynamika v průběhu roku

- Zimní včely jsou velmi rozdílné proti letním včelám



<https://doi.org/10.1038/s41396-019-0568-8>

## Probiotika pro včely?

- V současné době nabídka spíše kultur z mlékárenského průmyslu bez vědecky ověřeného účinku


Tab. 1 Nabídka probiotických přípravků na internetovém trhu, složení a účinky, převzato z (5)

| Výrobek                            | Výrobce                | Obsah látek                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prohlášený efekt nebo efekt publikovaný ve vědecké literatuře                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apiflora                           | Blowet Pulawy, Polsko  | Lyofilizované vybrané kmeny laktobacilů, zejména Lactobacillus kunkeei a Fructobacillus fructus; 1 · 10 <sup>9</sup> CFU/lahvku; aplikace ve vodě nebo ovčím mléce                                                                                                                                    | Včelí izoláty, účinek vůči P. larvae a N. ceranae. Snížení mortality v křídlových pokusech. <a href="https://blowet.pl/en/produkty/apiflora-2/">https://blowet.pl/en/produkty/apiflora-2/</a> (2).                               |
| EM <sup>®</sup> PROBIOTIC FOR BEES | EMRO, Japonsko         | Široké spektrum bakterií mléčného kvašení, kvasinek a fotosyntetizujících bakterií.                                                                                                                                                                                                                   | Inhibice rosenbůžy - snížení počtu spor ve včelstvech, silnější včelstva. Pozitivní fyziologické změny u dělnic (3).                                                                                                             |
| SuperDFM <sup>®</sup> - Honeybee   | Strong Microbials, USA | Sušené kmeny L. acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium bifidum, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, B. subtilis, B. licheniformis, B. pumilus, fermentační produkty, sušený fermentovaný B. subtilis, 1 x 10 <sup>9</sup> CFU/g, 1 x 10 <sup>9</sup> CFU/g, 1 x 10 <sup>9</sup> CFU/g | Zlepšení výživy, podpora zdraví trávicího traktu, imunity, obnova mikrobiální rovnováhy. <a href="https://www.strongmicrobials.com/honeybee">https://www.strongmicrobials.com/honeybee</a>                                       |
| SuperDFM <sup>®</sup> + P801™      | Strong Microbials, USA | Složení jako u SuperDFM <sup>®</sup> - Honeybee, plus Lactococcus acididurans, 2 · 10 <sup>9</sup> CFU/g bakterií mléčného kvašení.                                                                                                                                                                   | Podpora a stimulace imunitního systému, zlepšení přijetí potravy, snížení mortality po vysazení na nové místo. <a href="https://www.strongmicrobials.com/superdfm-p801/">https://www.strongmicrobials.com/superdfm-p801/</a> (4) |

Zdroj: včelařství, 01/2023

## Zdravá mikrobiota vs. dysbióza

- V případě stresu, vystavení pesticidům apod. dochází k dysbióze – nerovnovážnému stavu
- Klesá podíl laktobacilů a stoupá podíl náhodného osídlení




<https://doi.org/10.1016/j.jim.2020.06.006>

## Vývoj probiotického přípravku ke zvýšení odolnosti včel vůči infekčnímu tlaku

- Otestováno více než 150 izolátů včelích bakterií proti 7 kmenům *P. larvae* a *S. marcescens*
- Několik kmenů výrazně inhibovalo jednu nebo obě bakterie

Aktivní



Neaktivní











**VŠECH  
ŠTÍT**  
6 miliard  
přísad pro ochranu  
lidské a zvířecí  
lékařské praxe  
v Česku



**VŠECH  
ŠTÍT**  
6 miliard  
přísad pro ochranu  
lidské a zvířecí  
lékařské praxe  
v Česku

- 

**VEŠLÍ  
ŠTÍT**

6 miliard  
přirozených včelích  
bakterií pro zdraví  
včelstva

Experimentální probiotický přípravek  
s bakterii přirozeného mikrobiomu  
a antagonistickým účinkem  
proti všem patogenům

Zvyšuje odolnost včel  
včetně nových infekčních tlaků

- VEŠLÍ  
ŠTÍT**
- 6 miliard  
přirozených včelích  
bakterií pro zdraví  
včelstva
- Experimentální probiotický přípravek  
s bakterii přirozeného mikrobiomu  
a antagonistickým účinkem  
proti všem patogenům
- Zvyšuje odolnost včel  
včetně nových infekčních tlaků





# Taje kyseliny šťavelové aneb její vliv na včelu medonosnou

- Mgr. Eliška Beranová -

VÚVEL Academy

5.11.2025

## Kleštěk včelí

*Varroa destructor*



*Varroa destructor*



## Akaricidy

syntetické akaricidy


Flumethrin  
Amitraz  
Fluvalinate  
Coumaphos



přírodní akaricidy


esenciální oleje (Thymol)  
kyselina mravenčí  
kyselina šťavelová





# Kyselina šťavelová

- organická kyselina
- krystalická látka
- chemicky stabilní
- vyskytuje se i v přírodě
- leptavé účinky



- lze použít hned několika způsoby

## 2) Pokap

- častá a tradiční metoda
- aplikace za pomoci injekční stříkačky
- použití cukerného roztoku k rozpouštění kyseliny šťavelové



## 1) Sublimace

- proces, kdy pevná látka přechází přímo do plynného skupenství
- teplota tání kyseliny šťavelové je 150°C
- potřebné vybavení




## 3) Pásy s glycerolem a kyselinou šťavelovou

- relativně nová metoda
- dlouhodobá aplikace
- kyselina je rozpouštěna v glycerolu a tato směs je napuštěna do papírových či kartonových pásek



# Rozdílná množství KŠ



## Jaký je princip účinku?


krystalky / leptání polštářku / změna pH / změna složení hemolymfy

- změna pH
- změna ve složení hemolymfy
- krystalky



Figure 2. Intact varroa mite (A) and varroa mite from Group 3 (short exposure to oxalic acid) with white crystals of oxalic acid attached to their legs (B).  
doi.org/10.1080/000218839.2017.1327937

# Výhody a nevýhody aplikace



## Jaký je princip účinku?

krystalky / leptání polštářku / změna pH / změna složení hemolymfy

- změna pH
- změna ve složení hemolymfy
- krystalky
- leptání polštářků na nohou





Figure 2. Intact varroa mite (A) and varroa mite from Group 3 (short exposure to oxalic acid) with white crystals of oxalic acid attached to their legs (B).  
doi.org/10.1080/000218839.2017.1327937




# Residua v medu

- Kyselina šťavelová je přirozenou součástí nektaru.
- Avšak mohou se residua z léčby kyselinou šťavelovou dostávat do medu?

NE X ANO



## Toxicita



- 5 dní od aplikace



- 14 dní od aplikace




Některá včelstva ubrousily vykusují

Podložka s rozkousanými ubrousky a roztoči



## Vedlejší účinky

- vliv na buňky středního střeva



**Figure 1.** Midgut epithelial cells of formalin-fixed, paraffin-embedded 5-day-old larvae, 5 h after an oxalic acid (OA) treatment. Cell death was detected by the TUNEL technique using terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)-mediated dUTP for DNA labelling, an anti-fluorescent alkaline phosphatase conjugated antibody (ISCPDCK), fast red for visualization, and counterstaining with haematoxylin. Dense red azo dye staining localised to the nuclei (➔) of the columnar cells of the midgut epithelium. The figure shows 3-day-old larvae and the TUNEL technique was performed using "In situ" cell death detection kit (Roche). The figure shows 3-day-old larvae, 21 h after an OA treatment. Red azo dye staining is localised in the midgut columnar epithelial-cell nuclei (➔) indicative of impending cell death. Staining is absent in the regenerative epithelial-cell nuclei (➔). Magnification: 200 x.




## Vedlejší účinky


- vliv na buňky středního střeva
- změna chování dospělých včel
- ovlivnění nezavíčkované snůšky



# BeeGroup





## Jak ovlivňuje dlouhodobá aplikace OA fyziologii jednotlivých včel?




# Metody


## Antimikrobiální aktivita



## Antimikrobiální peptidy




## Antimikrobiální aktivita



- Po ošetření proužky s kyselinou šťavelovou a glycerinem došlo ke zvýšení antimikrobiální aktivity.
- K největšímu zvýšení došlo 72 hodin po ošetření.




## Koncentrace apidaecinu



- Koncentrace apidaecinu se po ošetření kyselinou šťavelovou s glycerinem ve formě páska v průběhu času zvyšovala.

## Hlady antimikrobiálních peptidů

- Hladiny AMPs se zvyšují ve skupině ošetřené OA-G s vrcholem 72 hodin po ošetření, zatímco kontrolní skupina, skupina ošetřená flumethrinem a skupina ošetřená OA-T zůstává v měřených časových bodech stabilní až do 192 hodin.





## Závěr

01.

Pouze u kyseliny šťavelové s glycerinem byl pozorován účinek na organismus včely medonosné.

02.

Ze zkoumaných parametrů fyziologie, dlouhověkosti a imunity byla ovlivněna pouze imunita.

03.



Jaký vliv má dlouhodobá indukce humorální imunity na zdraví včelstev?

## Zvápenatění včelího plodu

- Zvápenatění způsobuje houba *Ascosphaera apis*.
- Toto onemocnění není pro včelstvo zničující, ale nedostatek zdravé snůšky má za následek snížení počtu včel a nižší produkci.
- Klinickými příznaky jsou mumifikované kukly včel, viditelné na dně úlu a v plástech.




Dlouhodobá aplikace OA se současným výskytem zwápenatění včelího plodu a jejich vliv na fyziologii včely medonosné








## GENOVÁ EXPRESE




## Relativní genová exprese abaeicinu



- Relativní genová exprese abaeicinu se po léčbě OA-G snížila jak u včel ze zdravých včelstev, tak u včel z nemocných včelstev.
- Skupiny OA-G a OA-G&A<sub>4</sub>Apis se tak významně lišily od kontrolní skupiny ( $p < 0.001$ ).




## Relativní genová exprese hymenoptaeicinu




- Stejný vzorec lze pozorovat u relativní genové exprese hymenoptaeicinu.
- Skupiny OA-G a OA-G&A<sub>4</sub>Apis se významně liší od kontrolní skupiny a skupiny A<sub>4</sub>Apis ( $p = 0.003$ , resp.  $p = 0.004$ ).



## PROTEOMIKA



## Relativní genová exprese defensinu




- Relativní genová exprese defensinu se po léčbě OA-G zvýšila jak u včel ze zdravých včelstev, tak u včel z nemocných včelstev.
- Skupiny OA-G a OA-G&A<sub>4</sub>Apis se tak významně lišily od kontrolní skupiny ( $p < 0.001$ ).

## OLPS-DA - supervizovaná analýza

n = 30

- Distribuce proteinů ve skupině OA-G se od kontrolní skupiny liší.
- Bylo identifikováno více než 1187 proteinů.



■ CTRL ■ OA-G ■ A. APIS ■ OA-G + A. APIS

## Take home message

STRES

IMUNITA

RISK

ROVNOVÁHA

Kyselina šťavelová (OA-G proužky), ač široce používána, nepůsobí pouze na roztoče, ale ovlivňuje také imunitu a metabolismus včelích larev.

Expozice kyselině šťavelové zvyšuje aktivaci imunitního systému, ale zároveň zvyšuje stres a energetické nároky, což může učinit včelstva náchylnějšími k onemocněním, jako je vápenatění plodu.

Proteomická analýza odhalila výrazné změny v expresi proteinů, včetně antimikrobiálních peptidů a detoxikačních drah.

Včelaři by měli pečlivě zvážit dávkování a načasování aplikace OA, protože tyto ošetření mohou mít nežádoucí vedlejší účinky na zdraví plodu.

## Klíčové úkoly do budoucná

- Které metabolické dráhy jsou ovlivněny kyselinou šťavelovou?

- Jak se kyselina šťavelová šíří včelstvem?  
Jak se plod dostane do kontaktu s kyselinou šťavelovou?

## Jedí včely kyselinu šťavelovou?

Jednoduchý pokus - cukerný roztok s přísadkou barviva CBB  
- cukerný roztok s **kyselinou šťavelovou** s přísadkou barviva CBB





Cukerný sirup s CBB



Je možné rozvinutí  
rezistence?



Cukerný sirup kyselinou šťavelovou s CBB



**Mgr. Eliška Beranová**

Univerzita Palackého v Olomouci  
Katedra Biologie  
[eliska.beranova@upol.cz](mailto:eliska.beranova@upol.cz)



Děkuji za  
pozornost

**MUNI  
SCI**

prof. Pavel Hryšl  
Pavel Dobeš, Ph.D.  
Jana Hurýchová, Ph.D.



Per Krüger, Ph.D.  
Dalibor Titěra



René Lenobel, Ph.D.  
Jaroslava Friedecká, Ph.D.

Tato práce byla podpořena z projektu NAZV QK1910286 a QJ24010241 a Nadačním fondem Univerzity Palackého.






## Vitamín C a včely: Pomocník nebo riziko?


Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. | Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB, Přírodovědecká fakulta, MU  
pavel.dobes@mail.muni.cz

### Vitamín C alias askorbová kyselina




- Antioxidant – chrání buňky před oxidačním stresem a poškozením volnými radikály.
- Podpora imunity – zvyšuje odolnost včel vůči infekcím (např. virovým a bakteriálním chorobám).
- Detoxikace – podílí se na neutralizaci toxických látek (např. pesticidů).
- Podpora metabolismu – nezbytný pro správnou funkci enzymů účastnících se metabolismu bílkovin, tuků a sacharidů.
- Reprodukce a vývoj – pozitivně ovlivňuje vývoj larev a životaschopnost matek.
- Stresová odolnost – pomáhá včelám lépe snášet teplotní či výživový stres.
- Kvalita medu a podpora vitality včel – přispívá ke zvýšení celkové vitality a produktivity včelstva.

### Vitamín C alias askorbová kyselina



- Experimentálně nepotvrzeno – mnohé z přisuzovaných efektů nebyly u včel studovány nebo nebyly potvrzeny.
- Malé množství relevantních zdrojů – nízká odbornost zdrojů, často pochybné časopisy.
- Variabilita dávek a způsobů podání – složité srovnání pozorovaného efektu.
- Možné nežádoucí (prooxidantní) účinky – zejména při vysokých dávkách, možné interakce s jinými antioxidanty a složkami potravy.
- Laboratorní výsledky nemusí odpovídat polním podmínkám

### ANTIOXIDANTY UVČEL




- ochrana před negativním působením oxidačního stresu
- komplexní systém látkových a enzymatických antioxidantů
- jednotlivé antioxidanty nejsou funkčně rovnocenné




## SEZÓNÍ DYNAMIKA DALŠÍCH ANTIOXIDANTŮ

- změny hladiny askorbové kyseliny koreluje se změnou koncentrace glutathionu
- askorbát-glutathionový cyklus (redukce dehydroaskorbátu pomocí glutathionu)
- multifunkční protein vitellogenin má maximum v zimních měsících



## VITAMÍN C JAKO DOPLNĚK POTRAVY VČEL


- askorbová kyselina je na trhu velice dobře dostupná
- cena kolem 100 – 200 Kč/kg
- podání v cukerném roztoku (50% sacharóza)
- Apilac (1 g askorbové kys. na 100 g; dávka 1 g na 10 l)
- obvyklá dávka askorbové kyseliny 0,2 % nebo 0,4 % (4 gramy askorbové kyseliny na liter)
- testy prováděny v kontrolovaných podmínkách na dělnících různého stáří v klíčových experimentech



MUNI  
SCI

## VITAMÍN C JAKO DOPLNĚK POTRAVY VČEL


- efekt podání testován ve vybraných obdobích během roku
- hladina askorbové kyseliny v hemolymfě měřena pomocí EPR
- kontrolní skupina krmena pouze cukerným roztokem bez přídavku askorbové kyseliny
- sezónně závislý účinek! Podání je přínosné v zimních měsících, kontraproduktivní během letních měsíců.



MUNI  
SCI

## ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINKY VITAMÍN C

- přímý důkaz účinku proti bakteriím, *Nosema apis*, příp. proti Varroa zatím chybí
- prooxidační účinek, snížení pH, prevence dysbiózy ve střevě a vzniku oxidačního stresu
- znamená zvýšená hladina askorbové kyseliny v hemolymfě také její vyšší antimikrobiální aktivitu?




- testováno na včelách, kterým byla podána 0,4% askorbová kyselina
- po podání odebrána hemolymfa
- měřeno pomocí radiální difúze v agaru
- aktivita proti G+ bakterií *Micrococcus luteus*
- čím větší projasněná zóna, tím vyšší antimikrobiální aktivita hemolymfy
- jako standard použit čistý lysozym

MUNI  
SCI



ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINKY VITAMÍNU C

- zvýšení antimikrobiální aktivity potvrzeno v lednu
- meziroční rozdíly
- antimikrobiální aktivita je během hlavní části sezóny minimální a přidavek askorbové kyseliny na ni nemá vliv




ZVÝŠUJE VITAMÍN C ODOLNOST VČEL?


- testováno za kontrolovaných podmínek v klíčových experimentech
- včelám byla podána 0,4% askorbová kyselina a po pěti dnech byly experimentálně infikovány
- kontrolní skupiny krmeny a ošetřeny pouze cukerným roztokem
- orální infekce bakterií *Serratia marcescens* (kmeny k22, k211 a k219)
- mortalita sledována dalších pět dní po nákaze



ZVÝŠUJE VITAMÍN C ODOLNOST VČEL?



ZVÝŠUJE VITAMÍN C ODOLNOST VČEL?



## ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

- včely získávají vitamín C především z rostlinných zdrojů a jeho hladina v hemolymfě vzrůstá mezi březnem a zářím
- přídavek vitamínu C do potravy může být kontraproduktivní v době, kdy ho mají včely dostatek z přirozených zdrojů
- suplementace vitamínu C mimo hlavní sezónu může zvýšit jeho hladinu a antimikrobiální aktivitu v hemolymfě
- zvýšení celkové odolnosti včel po přidavku vitamínu C nebylo zatím experimentálně prokázáno
- přídavek vitamínu C lze zvažovat spíše na konci sezóny

**MUNI**  
SCI



Univerzita Palackého  
v Olomouci



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Tato práce vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství, projektů QK21010088 a QL24010241.

**MUNI**  
**SCI**

# Jakou virovou kontaminaci nalézáme v medu?

Jana Prodělalová


VÚVeL ACADEMY 5.11.2025, Brno

Financováno projektem NaCeBiVet TNo20000017



## Možné způsoby kontaminace prostředí včelími viry


Viry jsou vnitrobuněční parazité a jejich výskyt je zcela závislý na výskytu hostitelů.



Manley, R., Boots, M., Wilfert, L. Emerging viral disease risk to pollinating insects: ecological, evolutionary and anthropogenic factors. J Appl Ecol 2015;52:331-340.



## Přenos virů a jejich udržování v populaci včel



VÚVeL ACADEMY 5.11.2025, Brno



Cílem experimentu bylo určit míru virové kontaminace medných zásob a srovnat výskyt virů v medných zásobách a včelách v rámci jednoho včelstva.



Postup

1. Sběr vzorků (2024) ve spolupráci v VÚ Včelařským – 14 stanovišť/3 včelstva/zásoby i dělnice



1. Izolace virové RNA metodou TRI Reagent®
2. Detekce virů pomocí RT-qPCR  
DWV, BQCV, SBV, ABPV, CBPV, SBPV



| Stanice - stanoviště  | Včely |      |     |  | Med |      |     |
|-----------------------|-------|------|-----|--|-----|------|-----|
|                       | DWV   | BQCV | SBV |  | DWV | BQCV | SBV |
| Přerov - Jindřichov   |       |      |     |  |     |      |     |
| Přerov - Něčín        |       |      |     |  |     |      |     |
| Dol - Dol             |       |      |     |  |     |      |     |
| Dol - Veltrusy        |       |      |     |  |     |      |     |
| Dol - Neuměřice       |       |      |     |  |     |      |     |
| Dol - Husinec         |       |      |     |  |     |      |     |
| Skřivánek – Skřivánek |       |      |     |  |     |      |     |
| Skřivánek – Petrkov   |       |      |     |  |     |      |     |
| Skřivánek – Lípa      |       |      |     |  |     |      |     |
| Kývalka – Kývalka     |       |      |     |  |     |      |     |
| Kývalka – Rosice      |       |      |     |  |     |      |     |
| Liběchov – Liběchov   |       |      |     |  |     |      |     |
| Liběchov – Rymář      |       |      |     |  |     |      |     |
| Liběchov - Počeplice  |       |      |     |  |     |      |     |



| Stanice - stanoviště  | Včely |        |       | Med   |        |       |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
|                       | ① DWV | ② BQCV | ③ SBV | ② DWV | ① BQCV | ③ SBV |
| Přerov - Jindřichov   |       |        |       |       |        |       |
| Přerov - Něčín        |       |        |       |       |        |       |
| Dol - Dol             |       |        |       |       |        |       |
| Dol - Veltrusy        |       |        |       |       |        |       |
| Dol - Neuměřice       |       |        |       |       |        |       |
| Dol - Husinec         |       |        |       |       |        |       |
| Skřivánek – Skřivánek |       |        |       |       |        |       |
| Skřivánek – Petrkov   |       |        |       |       |        |       |
| Skřivánek – Lípa      |       |        |       |       |        |       |
| Kývalka – Kývalka     |       |        |       |       |        |       |
| Kývalka – Rosice      |       |        |       |       |        |       |
| Liběchov – Liběchov   |       |        |       |       |        |       |
| Liběchov – Rymář      |       |        |       |       |        |       |
| Liběchov - Počeplice  |       |        |       |       |        |       |



| Včely [kopie genomu/1 včela]   |                                 |                                 |  |  | Med [kopie genomu/1 ml medu]   |                                |                               |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DWV                            | BQCV                            | SBV                             |  |  | DWV                            | BQCV                           | SBV                           |
| 10 <sup>8,3</sup><br>(n=39/42) | 10 <sup>5,78</sup><br>(n=32/42) | 10 <sup>5,41</sup><br>(n=12/42) |  |  | 10 <sup>6,2</sup><br>(n=11/42) | 10 <sup>5,9</sup><br>(n=17/42) | 10 <sup>5,8</sup><br>(n=6/42) |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Výzkum byl financován dílčím projektem 009 „<i>Systém včasného varování pro závažná virová a bakteriální onemocnění včely medonosné a postupy pro následná opatření v chovech a jejich okolí</i>“ projektu TN02000017 NaCeBiVet.</p> | <div>  VÚVeL </div> <div> VÚVeL ACADEMY 5.11.2025, Brno </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Aktuální zkušenosti s metodou přemetení při tlumení bakteriálních chorob včel



Martin Kamler

VÝZKUMNÝ ÚSTAV  
VČELAŘSKÝ

VÚVEL Academy, Brno 5.11. 2025



### Přemetení na mezistěny

Oddělení dospělých včel od starého – infikovaného - voskového díla a přemístění včel na nové mezistěny

Norské/finské/severské zimování – *Nosema apis*

Primárně snížení infekčního tlaku patogeny – *Paenibacillus larvae*, *Melissococcus plutonius*, *Ascosphaera apis*, *Nosema spp.*, *Varroa destructor* a viry, *Tropilaelaps mercedesae*

Zootecnické využití – změna rámkové míry, zvýšení produkce plástů a vosku

### Přemetení na mezistěny

Co je potřeba?

Příprava a čas! Nákup nových úlů nebo dezinfekce prázdných nástavků, úlových den, rámků a mezistěn

Načasování: 15.4. – 15.7.

snůškové období/krmení cukrným roztokem či medocukrovým těstem

### Přemetení na mezistěny

Co je potřeba?

Nový/dezinfikovaný úl – dno, nástavky

Nové/dezinfikované rámký s mezistěnami (žádné souše či plásty!)

Smetáček, ..... čas!

Značené matky



Kamler M. a kol. 2017



## Částečné přemetení na mezistěny


Mosca et al. 2023, pouze plodové plásty

**Abstract:** American foulbrood (AFB) and European foulbrood (EFB) are the two most important bacterial diseases that affect honey bee brood. The aim of this study was to evaluate the effects of an integrated treatment of AFB and EFB in naturally infected colonies in spring, using the beekeeping technique partial shook swarm combined with oxytetracycline treatment. The following parameters were assessed: strength of the colonies, consumption of antibiotic solution, queen losses, honey production and relapses. An increase in strength was observed in both (AFB and EFB) groups. Mean syrup consumption in the AFB colonies was 444.2 mL, while in the EFB colonies it was 497.3 mL. Linear correlation between the strength of the colonies and consumption ( $p$ -values < 0.0001;  $R^2 = 0.448$ ) was observed. Three queens out of thirty (10%) were lost during the shook swarm procedure: one in the AFB group (5.3%) and two in the EFB group (18.2%). The results highlighted four clinical relapses (22.2%) of AFB, and no relapse (0%) of EFB after two years of observation. Six colonies (four in the AFB group and two in the EFB group) produced honey in the same beekeeping season that the shook swarm and antibiotic treatment were performed. Partial shook swarm is a good alternative to colony destruction, especially for EFB, and provides productive colonies during the foraging season.

## Částečné přemetení na mezistěny

Mosca et al. 2023, pouze plodové plásty  
Kombinace s podání ATB – OTC!  
V EU nejsou ATB pro včelařství registrována.  
Mor a hnilobu je zakázáno léčit.

Rezidua OTC v medu vyšší než MRL pro potraviny!



Koncept One health – Une santé – **Jedno zdraví**  
**Rezistence bakterií na antimikrobiální látky se stává největším problémem humánní i veterinární medicíny!**

- EurBee konference Bělehrad 21.9. 2022
- Dr. Elemir Simko; Uni of Saskatchewan, Kanada

Profylaxe USA/Kanada: antibiotika

46 080 kg oxytetracyklinu v Severní Americe do včelstev


Zamezí vzniku klinického onemocnění, spory zůstávají

Rezidua v medu a rezistence bakterií vůči ATB!

EVROPA – NE antibiotikům ve včelařství



## Mor včelího plodu




K 24.10. 2025, svscr.cz

## Přemetení: mor včelího plodu



## Hniloba včelího plodu




K 24.10. 2025, svscr.cz

2.-3. 6. 2013







- 8 smetenců, zazimováno 7  
- 20 smetenců, zazimováno 20

Přemetení: mor včelího plodu

| 2013       | pozitivní průkaz <i>P. larvae</i> /n včelstev |                |       |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|
| stanoviště | březen                                        | červen         | srpen |
| 1          | 15/37                                         | přemetení včel | 0/7   |
| 2          | 12/29                                         | přemetení včel | 0/21  |

Přemetení: mor včelího plodu

| 2014       | pozitivní průkaz <i>P. larvae</i> /n včelstev |       |              |       |       |
|------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| stanoviště | Březen                                        | Duben | Duben        | Srpen | Říjen |
| 1          | 1/7                                           | 0/7   | konec pokusu |       |       |
| 2          | 1/21                                          | 0/21  | 0/1          | 10/20 | 3/12  |


klinické  
prohlídky  
negativní



Přemetení: mor včelího plodu

| 2015                             | pozitivní průkaz <i>P. larvae</i> /n včelstev |              |                              |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| stanoviště                       | leden                                         | červen       | červenec                     |  |
| 2<br>(zazimováno<br>20 včelstev) | směsné<br>vzorky<br>měli<br>1/3               | měl<br>12/19 | prohlídky<br>klinika mvp 3x! |  |

Pokusné stanoviště – přemetení úspěšné  
Přenos infekce z blízkého stanoviště – řešení opakovaným  
přemetáním při detekci *P. larvae* bez KP vždy!




Přemetení: hniloba včelího plodu

2025: Liberecký kraj, spolupráce s KVS pro Liberecký kraj  
10 včelstev – vyšetření měli *M. plutonius* +  
Květen: 2 včelstva KP +, likvidace částečná  
Červen: prohlídky a přemetení 9 včelstev (+ 1 roj),  
odběry vzorků  
4 pozitivní *M. plutonius* z měli  
přemetení po 1 týdnu od likvidace 2 včelstev

Srpen: negativní *M. plutonius* z měli

Ztráta 2 matek  
1 den práce/3 osoby/ vytavení 74 plástů (cca 1/3!)

Přemetení: hniloba včelího plodu





Přemetení: hníloba včelího plodu



Přemetení: hníloba včelího plodu



Přemetení: hníloba včelího plodu



Přemetení: hníloba včelího plodu





## Přemetení na mezistěny

Při částečných likvidacích ohniska moru a hniloby včelího plodu nutnost.

Společně s aplikací probiotik – prevence dysbiózy, pozitivní ovlivnění mikrobiomu a potlačení patogenních mikroorganismů

Vyzkoušejte na 1 včelstvu, součást výuky a správné praxe

„To jsem netušil, kolik toho včely dokážou vystavět.“



Včelaři a veterináři SVS

Beedol: Daniela Malátová, Veronika Jeřábková, Dalibor Titěra

Univerzita Palackého Olomouc: Jiří Danihlík a spol

VÚVeL: Jana Prodělalová, Romana Moutelíková

**Děkuji za pozornost**



VÝZKUMNÝ ÚSTAV  
VČELAŘSKÝ

S podporou Mze NAZV QL24010241



# Poznatky o možnostech dezinfekce pomocí laserových paprsků

Mgr. Veronika Jeřábková  
Ing. Dalibor Titěra, CSc.  
Ing. Vojtěch Purnoch



NAARRAN  
LASER PRECISION



VÝZKUMNÝ ÚSTAV  
VČELAŘSKÝ



Brno, 5. 11. 2025

... a dali jsme si do plánu v tom pokračovat

Nyní opět musíme laboratorně zjistit účinnost proti patogenům včel




## Což využít laserové čištění?

VUVeL Academy 1.11.2023




## Troška fyziky na začátek...

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  
„zesilování světla stimulovanou emisí záření“




Zdroj: Lt.cz






# LASER

„zesilování světla stimulovanou emisí záření“




obrazovka.com 20050302



# LASER


„zesilování světla stimulovanou emisí záření“



# LASER

Pro použití v terénu:

- **Vláknové lasery (1064 nm)** → čištění, svařování, značení...
- **Diodové lasery (800–980 nm, 405–650 nm)** → svícení, zaměřování, ohřev plastů...
- **CO<sub>2</sub> lasery (10,6 μm)** → řezání a gravírování nekovů; menší přenosné stroje.
- **He-Ne (632,8 nm)** → měřicí přístroje a optické zaměřovače (často nahrazené diodami).



# LASER




„zesilování světla stimulovanou emisí záření“

| Parametry    |           |                                 |  |
|--------------|-----------|---------------------------------|--|
| vlnová délka | 1064 nm   | také UV i IR                    |  |
| délka pulsu  | CW/pulzní | ns, ps, fs ( $10^{-15}$ s)      |  |
| výkon        | až kW     | fluence ( $10 \text{ J/cm}^2$ ) |  |

...a teď už k biologii


## Možnosti očisty ve včelařství

- Čistící pud včel (*pin test*)



# LASER

„zesilování světla stimulovanou emisí záření“



...a teď už k biologii

## Možnosti očisty ve včelařství

- Čistící pud včel (*pin test*)
- Chemická dezinfekce
  - jodofory (FAM 30), halogeny (SAVO), louh, jedlá soda, peroxidy (Dismoson)
  - ozón (boom v covidové době)





...a teď už k biologii

## Možnosti očisty ve včelařství


- Čistící pud včel (*pin test*)
- Chemická dezinfekce
  - jodofory (FAM 30), halogeny (SAVO), louh, jedlá soda, peroxidy (Dismoson)
  - ozón
- Fyzikální dezinfekce
  - obměna díla, mechanická očista
  - teplota (plamen, horký vzduch)
  - UV záření (v laboratoři)
  - **LASER**



## Laserové ošetření: schéma pokusu



## Laserové ošetření: schéma pokusu



## Laserové ošetření: pokusné skupiny

| Skupina | Suspenze | Ošetření             | Laser | CFU/1ml |
|---------|----------|----------------------|-------|---------|
| 1       | +        | 0                    | +     | ?       |
| 2       | +        | 0                    | 0     | ?       |
| 4       | +        | Propolisová tinktura | 0     | ?       |
| 6       | +        | 70% etanol           | 0     | ?       |
| 8       | +        | vosk                 | 0     | ?       |
| 10      | 0        | 0                    | 0     | ?       |

PK

NK



Laserové ošetření: výsledky

| Skupina | Suspenze | Ošetření | Laser | CFU/1ml |
|---------|----------|----------|-------|---------|
| 1       | +        | 0        | +     | 55      |
| 2       | +        | 0        | 0     | 68      |

PK




Laserové ošetření: výsledky

| Skupina | Suspenze | Ošetření | Laser | CFU/1ml |
|---------|----------|----------|-------|---------|
| 1       | +        | 0        | +     | 55 ± 34 |
| 2       | +        | 0        | 0     | 68 ± 40 |

PK

Porovnání CFU mezi skupinami (nezávislé vzorky)



Laserové ošetření: výsledky

| Skupina | Suspenze | Ošetření             | Laser | CFU/1ml |
|---------|----------|----------------------|-------|---------|
| 1       | +        | 0                    | +     | 55 ± 34 |
| 2       | +        | 0                    | 0     | 68 ± 40 |
| 4       | +        | propolisová tinktura | 0     | < 10    |
| 6       | +        | 70% etanol           | 0     | < 10    |
| 8       | +        | vosk                 | 0     | < 0,1   |
| 10      | 0        | 0                    | 0     | 0       |

PK

NK




*Jak jsou na tom konzervativní metody?*

- Ošetření dřívěk vysokou teplotou (plamen, horkovzduch)



Ošetření teplotou: schéma pokusu



Má laser vůbec nějaké účinky  
na spóry *P. larvae*?

Může být účinnost laseru ovlivněna  
podkladovým materiálem?

➤ Ošetření spór na skleněných petriho miskách.



Ošetření teplotou: výsledky

| Skupina | Suspenze | Ošetření             | Laser | CFU/1ml |
|---------|----------|----------------------|-------|---------|
| 1       | +        | 0                    | +     | 55 ± 34 |
| 2       | +        | 0                    | 0     | 68 ± 40 |
| 4       | +        | Propolisová tinktura | 0     | < 10    |
| 6       | +        | 70% etanol           | 0     | < 10    |
| 8       | +        | vosk                 | 0     | < 0,1   |
| 9/1     | +        | plamen               | 0     | < 0,1   |
| 9/2     | +        | horký vzduch         | 0     | < 1     |
| 10      | 0        | 0                    | 0     | 0       |

PK



NK



Ošetření laserem na miskách: schéma pokusu



| Skupina | Suspenze | Laser             |                 |                | CFU/1ml |
|---------|----------|-------------------|-----------------|----------------|---------|
|         |          | Vlnová délka [nm] | Frekvence [kHz] | Expozice [sec] |         |
| 1       | +        | 1064 nm           | 105             | 60             | ?       |
| 2       | +        | 1064 nm           | 24              | 60             | ?       |
| 3       | +        | 350 nm - UVA      | 40              | 60             | ?       |
| PK      | +        | 0                 | -               | -              | ?       |
| NK      | 0        | 0                 | -               | -              | ?       |





Vláknový laser, 1064 nm




Gravírovací laser, 350 nm (UVA)



gravírovací laser.mp4



### Ošetření laserem na miskách: výsledky



| Skupina | Suspenze | Laser             |                 |                | CFU/1ml |
|---------|----------|-------------------|-----------------|----------------|---------|
|         |          | Vlnová délka [nm] | Frekvence [kHz] | Expozice [sec] |         |
| 1       | +        | 1064 nm           | 105             | 60             | >1200   |
| 2       | +        | 1064 nm           | 24              | 60             | >1200   |
| 3       | +        | 350 nm - UVA      | 40              | 60             | >1200   |
| PK      | +        | 0                 | -               | -              | >1200   |
| NK      | 0        | 0                 | -               | -              | 0       |

Tým z ČVUT zkoušel použití laseru na nesporeující bakterie, viry a plísně (mimo včelařství).  
Design pokusu měli obdobný jako my.

- **VÝSLEDEK:** laser může mít pouze ablační vliv (tj. může mikroby mechanicky odstranit)
- (ústní sdělení)



## ZÁVĚR

- Běžně dostupné lasery pro dezinfekci ve včelařství využít **NELZE.**
- Naopak běžně používané a dostupné včelařské metody (oplálení nástavků) jsou dostatečně účinné.
- Včelí produkty (vosk, propolis) mají přirozeně antimikrobiální účinky a pomáhají snižovat míru infekčního tlaku ve včelstvu.



Trojí síla při boji s patogenem



**Silné včely**

výživa, čistící pud

+


**Chemická dezinfekce**

Savo, louh, FAM 30...

+

**Fyzikální dezinfekce**

opálení, mechanická očista,  
výměna díla



Děkujeme za pozornost

Řešeno v rámci řešení projektu TA ČR: TN02000017 **NaCeBiVet.**

Dílčí projekt 009:

Systém včasného varování pro závažná virová a bakteriální onemocnění včely medonosné a postupy pro následná opatření v chovech a jejich okolí.



www.beedol.cz



VÝZKUMNÝ ÚSTAV  
VČELAŘSKÝ

@ beedol@beedol.cz



Copyright:

Výzkumný ústav veterinárního  
lékařství, v. v. i. Brno  
Hudcova 296/70, 621 00

Tel.: +420 773 756 631  
E-mail: [vri@vri.cz](mailto:vri@vri.cz)

[www.vri.cz](http://www.vri.cz)